



Guía de codificación para los Servicios Preventivos 2026

Auxilio Salud Plus administra su cubierta de beneficios preventivos conforme al Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) y Health Care and Education Affordability Act of 2010 (P.L. 111-152) y sus reglamentos interpretativos.

Los servicios de medicina preventiva estarán cubiertos al 100%, sin costos compartidos (\$0.00 copagos o 0% coaseguros) de acuerdo con la edad y género del suscriptor. Los servicios de cuidado preventivo a los que se aplican estas condiciones están definidos en el enlace que se les presenta a continuación:

<https://www.cuidadodesalud.gov/es/coverage/preventive-care-benefits/>

Auxilio Salud Plus cubrirá la evaluación y/o pruebas cuando son realizadas como parte de un servicio preventivo, de acuerdo con la edad y género del suscriptor. El suscriptor podrá consultar su folleto de beneficios para obtener detalles sobre estos beneficios de atención preventiva.

Las siguientes tablas proporcionan una guía de referencia rápida para presentar reclamaciones por servicios preventivos con un código de diagnóstico de "persona sana" como el diagnóstico principal (primer) de la reclamación. Esta información está destinada a ser una herramienta de referencia para su conveniencia y no es una garantía de pago.

Esta guía está sujeta a cambios en función de leyes y/o reglamentos nuevos o revisados, orientación adicional y/o la política médica de Auxilio Salud Plus, Inc.

Nota Importante: Los servicios deben facturarse con el diagnóstico apropiado, en el nivel de línea del reclamo (Bloque 24E), de acuerdo con las pautas de codificación estándar de la industria. Los servicios preventivos o de detección están destinados a quienes actualmente no presentan signos o síntomas de la enfermedad. Servicios considerados preventivos que se reciben en un entorno para pacientes hospitalizados, una sala de emergencias o que incluyan procedimientos o servicios de diagnóstico adicionales pueden estar sujetos a copago, deducible y coaseguro. La emisión de códigos de servicio (CPT, HCPC o ICD-10) cuando los signos o síntomas están presentes constituye una codificación inapropiada que podría resultar en un recobro del dinero pagado al proveedor de esos servicios. Además, estos servicios están sujetos a ciertas limitaciones dependiendo de la necesidad médica y de otra gestión médica razonable.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro centro de servicios al proveedor al 787-756-5971 o libre de costo al 1-888-787-0099.

Servicio Preventivo Adultos	Indicación	CPT or HCPCs Code(s)	ICD-10 Diagnóstico	Modificador 33
Cernimiento para la aneurisma abdominal aórtica (AAA)	Un (1) servicio de cernimiento para AAA por ultrasonografía en hombres de 65 a 75 años que sean fumadores o hayan sido fumadores en algún momento.	Código(s) Procedimiento(s): 76706, 76770, 76775	Z13.6 Z87.891	76706, 76770, 76775
Cernimiento para Trastornos de Ansiedad	USPSTF recomienda el cernimiento para trastornos de ansiedad en adultos (64 años o menos), incluyendo personas embarazadas o postparto.	99385, 99386	Z13.31, Z13.32 Z13.39	99385, 99386
Cernimiento de Diabetes Tipo II	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda cernimiento de nivel de azúcar en la sangre como parte de la evaluación del riesgo cardiovascular en adultos en edad entre 40 y 70 años cuales son obesos o tienen sobrepeso. Los clínicos deben ofrecer o referir los pacientes con niveles anormales de glucosa en la sangre para unas intervenciones de consejería intensiva de comportamiento para promover una dieta saludable y la actividad física. El cernimiento para diabetes tipo II en adultos asintomáticos con una presión sanguínea sostenida mayor que 135/80mm Hg.	Código(s) Procedimiento(s): Consejería: 99401-99409, G0447 Primera Visita: 99386-99387 Visita subsiguiente: 99396-99397 Códigos de Labs: 82947, 82948, 82950, 82952, 82962, 83036	Z00.00, Z00.01, Z13.1, E66.01, E66.09, E66.1, E66.2, E66.3, E66.8, E66.9, Z13.1, Z68.25, Z68.26, Z68.27, Z68.28, Z68.29, Z68.30, Z68.31, Z68.32, Z68.33, Z68.34, Z68.35, Z68.36, Z68.37, Z68.39, Z68.41, Z68.42, Z68.43, Z68.44, Z68.45	82947, 82948, 82950, 82952, 82962, 83036
Uso indebido de Alcohol: Adulto	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda el cernimiento de detección por el uso indebido de alcohol en entornos de atención primaria en adultos mayores de 18 años o más, incluidas mujeres embarazadas y provee a personas comprometidas con bebidas peligrosas o riesgosas una consejería de comportamiento intervenciones para reducir el uso indebido de alcohol.	Consejería: 99408-99409 Primera Visita: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397 Código(s) Procedimiento(s): G0442 ó G0443, G0396, G0397	F10.10, F10.120, F10.121, F10.129, F10.14, F10.150, F10.151, F10.159, F10.180, F10.181, F10.182, F10.188, F10.19, F11.10, F12.10, F13.10, F13.90, F15.90, F16.90, F17.290, Z71.41, Z71.51, Z71.6, Z87.891, Z91.89	
Consejería sobre uso de Aspirina para prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda comenzar el uso de aspirinas en una dosis menor para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal en adultos de 50 a 59 años que tiene un 10% o más de 10 años de riesgo cardiovascular, no ha aumentado el riesgo de sangrado, tiene una expectativa de vida de al menos 10 años, y están dispuestos a tomar aspirinas en dosis menores diariamente por al menos 10 años.	Consejería: 99401-99404 Primera Visita: 99386 Visita subsiguiente: 99396	Z41.8, Z13.6	
Cernimiento de Cáncer Colorrectal	La orden administrativa 334 del Departamento de Salud, se cubre un cernimiento anual de cáncer colorrectal mediante prueba de sangre oculta en adultos de 40 años en adelante. En adultos de 45 a 75 años. Hay diferentes pruebas de cernimiento de cáncer colorrectal, algunas se realizan cada 1-2 años y otras cada 5-10 años; consulte con su médico cual es la prueba apropiada para usted. Las pruebas cubiertas son aquellas que se realizan mediante pruebas de sangre oculta en heces fecales, sigmoidoscopia, o colonoscopia. Todas las pruebas de cernimiento de cáncer colorrectal según establecidas en las regulaciones están cubiertas sin copago.	Código(s) Procedimiento(s): G0104, G0105, G0106, G0120, G0121, G0122, G0328, 82270, 82274 ó G0328, 45330, 45333, 45334, 45338, G0104, 88305 y G0500, 45378, 45380, 45381, 45382, 45384, 45385, 74263, G0105, G0121, 00812, 88305 y	Z12.11, Z12.12, Z01.818	G0104, G0105, G0106, G0120, G0121, G0122, G0328, 82270, 82274 ó G0328, 45330, 45333, 45334, 45338, G0104, 88305 y G0500, 45378, 45380, 45381, 45382, 45384, 45385, 74263, G0105, G0121, 00812, 88305 y

		S0285	S0285	
Cernimiento de Depresión y Riesgo de Suicidio para adultos	La USPSTF recomienda un cernimiento de depresión en la población general de adultos, incluyendo mujeres embarazadas y post parto. El cernimiento debe ser implantado con sistema adecuado para asegurar el diagnóstico, tratamiento efectivo y seguimiento apropiado.	Consejería: 99401-99404 Primera Visita: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397 Procedimiento(s): G0444	Z13.31 Z13.32 Z13.39 Z13.89	
Prevención de caídas en adultos mayores: ejercicio o terapia física	El USPSTF recomienda ejercicio o terapia físicas para prevenir caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad y que corren mayor riesgo de caídas.	Consejería: 99401-99404 Primera Visita: 99387 Visita subsiguiente: 99397 Procedimiento(s): 97110, 97112, 97116, 97530, G0151, G0157, G0159, S9131 y S9476	Z91.81	
Consejería de dieta saludable y actividad física para prevenir condiciones cardiovasculares: adultos con factores de riesgo cardiovasculares	Consejería de dieta saludable y actividad física para prevenir condiciones cardiovasculares: adultos con factores de riesgo cardiovasculares. El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda ofrecer o referir los adultos que están sobrepeso u obesos y que tienen factores de riesgo de condiciones cardiovasculares adicionales a una consejería intervencional intensiva de conducta para promover una dieta saludable y la actividad física para la prevención de condiciones vasculares adicionales.	Consejería: 99401-99409 Primera Visita: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397	Z13.1, Z13.220, Z13.6, Z71.3	
Virus de la Hepatitis B: adultos y adolescentes no embarazadas	Cernimiento – Adultos con alto riesgo de infección.	Consejería: 99401-99404 Primera Visita: 99386-99387 Visita subsiguiente: 99396-99397 Procedimiento: 87350, 80055, 87340 ó 80081	Z11.59, Z23, Z34.00, Z34.01, Z34.02, Z34.03, Z34.80, Z34.81, Z34.82, Z34.83, Z34.90, Z34.91, Z34.91, Z34.93, Z33.1	87350, 80055, 87340 ó 80081
Virus de la Hepatitis C: adultos y adolescentes	Cernimiento – Adultos y adolescentes entre las edades de 18 a 79 años con alto riesgo de infección de Hepatitis C (HVC).	Consejería: 99401-99404 Primera Visita: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397 Procedimiento(s): 86803, G0472	Z00.00, Z00.01, Z11.59	
Cernimiento de hipertensión (HBP) - Alta presión sanguínea	Hombres y mujeres de 18 años en adelante; por lo menos cada 2 años; debe ser más frecuente si tiene 40 años o más. La USPSTF recomienda obtener medidas fuera del ambiente clínico o de cuidado del paciente para la confirmación del diagnóstico antes de comenzar el tratamiento.	Consejería: 99401-99404 Primera Visita: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397 Procedimiento(s): 93784, 93786, 93788, 93790	Z13.6	
Cernimiento de VIH: adultos y adolescentes no embarazadas	Cernimiento clínicos por la infección de VIH en adolescentes, adultos entre las edades de 15 a 65 años. Adolescentes menores y adultos mayores quienes el riesgo aumenta también deben ser evaluados. Según requerido por la Ley 45 de 2016, ésta cubierta incluye una prueba de VIH como parte de los exámenes de rutina de una evaluación médica, excepto en las	Procedimiento(s): 86689, 86701, 86702, 86703, 87390, 87534, 87535, 87536, 87389, 87391, 87537, 87538, 87539, 87901,	Z21, Z11.4, Z11.59, Z20.2, Z11.3, Z20.6, Z70.0, Z70.1, Z70.2, Z70.3, Z70.8, Z70.9, Z71.7, Z72.51, Z72.52, Z72.53	86689, 86701, 86702, 86703, 87390, 87534, 87535, 87536, 87389, 87391, 87537, 87538, 87539, 87901, 87903, 87904,

	mujeres embarazadas que aplica lo requerido por la USPSTF. Debe tener en cuenta las recomendaciones establecidas por el VIH del Departamento de Salud.	87903, 87904, 87906, G0432, G0433, G0435, S3645	87906, G0432, G0433, G0435
Obesidad	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda un cernimiento a todo adulto de obesidad. Los clínicos deben ofrecer o referir a los pacientes con un índice de masa corporal de 30kg/m2 o más a una intervención intensiva conductual multicomponente.	Consejería: 99401-99409 Primera Visita: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397 Procedimiento(s) G0447 ó G0473	Z13.89, Z71.2, Z76.89, Z00.00
Cernimiento Cáncer de pulmón	Cernimiento anual de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de dosis baja en adultos de 50 a 80 años que tengan historial de fumar por 20 años y que actualmente fuman o han dejado de fumar en los pasados 15 años. Se discontinuará el cernimiento una vez la persona ha dejado de fumar por 15 años consecutivos o han desarrollado problemas de salud que limitan sustancialmente su expectativa, habilidad o probabilidad de tener una cirugía curativa de pulmón.	Consejería: 99401-99404 Primera Visita: 99386-99387 Visita subsiguiente: 99396-99397 71250 71271	Z12.2, Z72.0, Z87.891
Enfermedades de Transmisión Sexual (STD por sus siglas en inglés)	El US Preventive Service Task Force (USPSTF) recomienda consejería conductual de alta intensidad para prevenir las infecciones transmitidas sexualmente a todo adulto y adolescente sexualmente activo a riesgo de una infección de transmisión sexual (STD por sus siglas en inglés).	Consejería: 99401-99404, G0445 Visita Inicial: 99384-99387 Visita Subsiguiente: 99394-99397, 99384, 99394	Z11.3, Z70.0, Z70.1, Z70.2, Z70.3, Z70.8, Z70.9, Z71.7, Z72.51, Z72.52, Z72.53
Uso de Estatinas en dosis baja a moderada para prevenir evento de enfermedad cardiovascular en adultos sin historial de enfermedad cardiovascular con factores de riesgo.	Para adultos con los siguientes factores de riesgos; - Adultos entre los 40 a los 75 años - Uno o más factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (ejemplo, dislipidemia, diabetes, hipertensión o fumador) y - Tienen un riesgo calculado de 10 años de un evento cardiovascular de 10% o más. La identificación de la dislipidemia y el cálculo del riesgo de evento de enfermedad cardiovascular a 10 años requiere la evaluación universal de los lípidos en adultos de 40 a 75 años.	Consejería: 99401-99404 Visita Inicial: 99386-99387 Visita subsiguiente: 99396-99397 80061 82465 83718	Z79.899, Z13.220
Profilaxis preventiva ante la exposición de infección de VIH	La USPSTF recomienda a los clínicos que ofrezcan profilaxis previa a la exposición (PeEP) con terapia antirretroviral a las personas que tienen alto riesgo de contagio del VIH	Consejería: 99401, 99402, 99403 Código(s) Procedimiento(s): 86701, 86703, 87389, 87390, 87534, 87535, 87536, 87900, 87901, 80074, 86704, 86705, 87340, 87517	Z20.2, Z20.5, Z20.6, Z818, Z828, Z77.21, W46.0XXA, W46.0XXD, W46.0XXS, W46.1XXA, W46.1XXD, W46.1XXS, Z20.81, Z51.89, Z79.899, B20, Z21, B16.9, B16.1, B17.0, Z22.51, B18.0, B18.1, B16.0, Z00.00, Z01.812, Z11.3, Z11.4, Z11.59, Z13.89
Uso indebido de Drogas y Alcohol: Adulto	La USPSTF recomienda la detección haciendo preguntas sobre el uso de drogas nocivas en	Visita inicial: 99385-99387 Visita subsiguiente	F11.10, F11.20, Z71.51

	adultos de 18 años o más. La detección se debe implementar cuando se puedan ofrecer o derivar servicios para un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y una atención adecuada. (La detección se refiere a hacer preguntas sobre el uso de drogas no saludables, no a analizar muestras biológicas).	99395-99397		
Sífilis	La USPSTF recomienda el Cernimiento de la infección de sífilis en personas de alto riesgo de contraer la infección.	Códigos Procedimiento(s): 86592, 86593, 86780 87166, 87164 y 87285	Z00.00, Z00.01, Z11.3, Z72.51, Z72.52, Z72.53	86592, 86593, 87166, 87164, 87285
Medicación de Tabaco: adultos y adolescentes no embarazadas	La USPSTF recomienda que todos los clínicos pregunten a todos los adultos sobre el uso del tabaco, los aconsejen para detener su uso y provean intervenciones conductuales. La US Food and Drug Administration (FDA) aprobó el fármaco terapia para el cese del uso de tabaco en adultos. Para aquellos que usan productos para cesar el uso del tabaco, Auxilio Salud Plus cubre el despacho de medicamentos aprobados por la FDA para dejar de fumar por noventa (90) días consecutivos en un intento y hasta dos (2) intentos por año. La recomendación no establece diferencia en los niveles(tier) de medicación para cesar de fumar. Sin embargo, el formulario incluye los medicamentos sin coaseguro sin importar el nivel (tier).	Consejería: 99406-99407 Visita inicial: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397	Z87.891, F17.200, F17.201, F17.203, F17.208, F17.209, F17.210, F17.211, F17.213, F17.218, F17.219, F17.220, F17.221, F17.223, F17.228, F17.229, F17.290, F17.291, F17.293, F17.298, F17.299, Z87.891	
Tuberculosis: adultos	Cernimiento para tuberculosis en poblaciones con alto riesgo.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397 Código(s) Procedimiento(s): 86580, 86480, 86481	Z00.00, Z00.01, Z11.1, Z11.7	
Inmunización: Tétano, Difteria y Pertusis (Td/Tdap)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90700, 90714, 90698, 90714, 90721, 90723	Z23	
Inmunización: Human Papillomavirus (HPV), según la Ley 255 del 15 de septiembre de 2012. (Edades entre 9 a 45 años)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90649, 90650, 90651	Z11.51, Z23	
Inmunización: Varicela	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación	Código(s) Procedimiento(s): 90716	Z23	

	del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).		
Inmunización: Zoster Herpes	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90736	Z20.5, Z20.6, Z20.828, Z23
Inmunización: Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90707, 90710	Z23
Inmunización: Influenza (Flu Shot)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90654, 90661, 90662, 90672, 90673, 90656, 90658, 90660	Z23
Inmunización: Neumococo	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90670, 90732	Z23
Inmunización: Hepatitis A	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90632, 90633, 90634	Z23
Inmunización: Hepatitis B	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de	Código(s) Procedimiento(s):	Z23

	Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	90746-90748		
Inmunización: Meningococo – Vacuna MCV4	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) Procedimiento(s): 90733, 90734	Z20.811, Z23	
Inmunización: COVID-19	Vacuna COVID-19 como parte de las inmunizaciones preventivas para adolescentes mayores de 16 años y adultos, de acuerdo con el orden establecido por el Departamento de Salud de Puerto Rico y las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC), de conformidad con el Artículo 2.050 (C) del Código de Seguros de Salud de Puerto Rico.	Código(s) Procedimiento(s): 91300*, 0001A, 0002A, 0003A, 0004A, 91301*, 0011A, 0012A, 0013A, 91303*, 0031A, 0034A *Los proveedores no deben facturar el producto si lo recibieron de forma gratuita.	Z23	
Servicio Preventivo Mujeres, incluyendo mujeres embarazadas	Indicación	CPT or HCPCS Code(s)	ICD-10 Diagnóstico	Modificador 33
Bacteriuria (o infección en el tracto urinario)	Cernimiento para identificar bacteriuria asintomática con cultivo de orina en mujeres embarazadas.	Código(s) Procedimiento(s) 81007, 87081, 87084, 87086 ó 87088	O09.00, O09.01, O09.02, O09.03, O09.10, O09.11, O09.12, O09.13, O09.211, O09.212, O09.213, O09.219, O09.291, O09.292, O09.293, O09.299, O09.30, O09.31, O09.32, O09.33, O09.40, O09.41, O09.42, O09.43, O09.511, O09.512, O09.513, O09.519, O09.521, O09.522, O09.523, O09.529, O09.611, O09.612, O09.613, O09.619, O09.621, O09.622, O09.623, O09.629, O09.811, O09.812, O09.813, O09.819, O09.821, O09.822, O09.823, O09.829, O09.90, O09.91, O09.92, O09.93, Z33.1, Z34.00, Z34.01, Z34.02,	81007, 87081, 87084, 87086 ó 87088

			Z34.03, Z34.80, Z34.81, Z34.82, Z34.83, Z34.90, Z34.91, Z34.92, Z34.93
BRCA	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda que los proveedores de cuidado primario le realicen cernimiento a las mujeres que han tenido familiares con: cáncer de seno, ovarios, trompas, peritoneal, con una o varias herramientas para realizar cernimiento diseñadas para identificar el historial familiar que pudiera estar asociado con un aumento del riesgo de mutaciones potencialmente perjudiciales en los genes de susceptibilidad al cáncer de mama. (BRCA1 o BRCA2). Mujeres con cernimiento positivo deben recibir una consejería genética y, si es indicado después de la consejería, una prueba de BRCA.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397 Código(s) Procedimiento(s): 81212, 81215, 81216, 81217, 81162, 81161, 81163, 81164, 81165, 81166, 81167	Z80.3, Z80.41, Z80.49, Z31.5, Z13.71, Z13.79
Exámenes de detección de cáncer de seno	Una mamografía de referencia, para mujeres entre treinta y cinco (35) y treinta y nueve (39) años, b. una mamografía anual para mujeres de cuarenta (40) años o más Una mamografía anual, tratamiento de seguimiento o pruebas de diagnóstico complementarias: - A mujeres de cuarenta (40) años o más, que tienen senos de tejido clasificado como heterogéneamente denso o extremadamente denso, según lo determinado por mamografía por un radiólogo, según la escala de densidad mamaria del Informe de proyección de imágenes y sistemas. y sistema de datos, BI-RADS, promulgado por el Colegio Americano de Radiología - A mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama debido a: - o A sus antecedentes familiares - o A su propia historia como paciente de cáncer - o Presencia de marcadores de alto riesgo en su perfil genético o 4. Otro factor determinado por su médico. El tratamiento de seguimiento o las pruebas de diagnóstico complementarias para la detección del cáncer de mama en mujeres de cuarenta (40) años o más, que tienen senos de tejido clasificado como heterogéneamente denso o extremadamente denso, puede incluir, entre otros, la lista de criterios de contenido. La USPSTF recomienda una mamografía de detección bienal para mujeres entre 50-74 años.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99386-99387 Visita subsiguiente: 99396-99397 Código(s) Procedimiento(s): 77067	Z12.39, Z12.31, Z00.00, Z00.01, Z15.01, Z80.3
Medicamentos preventivos para la	La USPSTF recomienda que los médicos se ofrezcan a recetar medicamentos para reducir	Consejería: 99401-99404	Z85.3, Z80.3

reducción del riesgo contra el cáncer de Seno.	el riesgo, como tamoxifeno, raloxifeno o inhibidores de la aromatasa, a las mujeres que tienen un mayor riesgo de cáncer de mama de 35 años o más y un riesgo bajo de efectos adversos de los medicamentos.	Visita inicial: 99385-99387 Visita subsiguiente: 99395-99397		
Lactancia	Apoyo y consejería a través de un proveedor adiestrado en lactancia durante el embarazo y/o en el periodo post parto, así como el acceso al equipo de lactancia y los suplidos, por nacimiento. Intervenciones durante el embarazo y luego del nacimiento para apoyar la lactancia. El equipo de lactancia está cubierto con orden médica luego del tercer trimestre de embarazo y hasta el primer año luego del parto. Los equipos y los suplidos adicionales para una máquina de lactancia están cubiertos y disponibles a través de proveedores contratados por Auxilio Salud Plus para esta cubierta.	Consejería: 99401-99404	Z34.00-Z34.93, Z39.1, O09.00- O09.03, O09.10- O09.13, O09.291, O09.40-O09.43, O09.211-O09.219, O09.10-O09.13, O09.291-O09.299, O09.30-O09.33, O09.511-O09.519, O09.521-O09.529, O09.611-O09-.619, O09.621-O09.629, O09.811-O09.819, O09.821-O09.829, O36.80X0-36.80X9, O09.70-O09.73, O09.891-O09.899, O09.90-O09.93	
Cernimiento de Cáncer Cervical	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda el cernimiento de cáncer cervical en la mujeres entre las edades de 21 a 29 años con citología (Papanicolaou) cada 3 años o, para mujeres entre las edades de 30 a 65 la cuales desean alargar el intervalo del cernimiento cada 3 años. Cernimiento con una combinación de citología y prueba de papiloma humano cada 5 años. Esta cubierta incluye el examen pélvico y toda clase de citología vaginal que pueda ser requerida por un médico para detectar, diagnosticar y tratar las etapas tempranas de las anormalidades que puedan causar Cáncer Cervical.	Código(s) Procedimiento(s): P3001, 87624, 87625, 88141- 88143,88147-88148, 88150, 88152, 88155, 88164-88167, 88174-88175, 88153	Z01.411, Z01.419, Z12.4, Z12.72, Z01.411, Z01.419, Z12.4, Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419, Z11.51, Z12.4	88141-88143, 88147-88148, 88150, 88152, 88153, 88155, 88164-88167, 88174-88175
Cernimiento de Clamidia y Gonorrea	Detección de la infección por clamidia en todas las mujeres embarazadas de 24 años o menos y en mujeres embarazadas de mayor edad que corren un mayor riesgo. Detección de infección por clamidia en todas las edades de mujeres jóvenes no embarazadas sexualmente activas (24) y más jóvenes y en mujeres mayores no embarazadas que tienen un mayor riesgo. La USPSTF recomienda la detección de gonorrea en mujeres sexualmente activas (24) años o menos y en mujeres mayores que tienen un mayor riesgo de infección.	Código(s) Procedimiento(s): 87110, 87270, 87320, 87810, 87490-87492	Z11.51, Z11.4, Z11.59, Z11.8, Z34.00-Z34.93, Z39.1, Z11.3, Z72.51, Z72.52, Z72.53, O09.00-O09.03, O09.10-O09.13, O09.291, O09.40-O09.43, O09.211- O09.219, O09.10-O09.13, O09.291-O09.299, O09.30-O09.33, O09.511-O09.519, O09.521-O09.529, O09.611-O09-.619, O09.621-O09.629, O09.811-O09.819, O09.821-O09.829, O36.80X0-36.80X9, O09.70-O09.73, O09.891-O09.899, O09.90-O09.93	87110, 87270, 87320, 87810, 87490-87492
Métodos Anticonceptivos aprobados por FDA.	Incluye todos los métodos anticonceptivos, aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), procedimientos de esterilización, la colocación de implantes	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99384 - 99386	Z30.011, Z30.012, Z30.013, Z30.014, Z30.018, Z30.019,	

	(entre ellos Barra Implantable (Rod Implantable), Dispositivo Intrauterino de Cobre (IUD Copper), Capuchón Cervical con Espermicida (Cervical Cap with Spermicide; FemCap Device 22MM), remoción o administración de métodos anticonceptivos, educación y consejería para todas las mujeres con capacidad reproductiva; según prescrito por el médico., remoción o administración de métodos anticonceptivos, educación y consejería para todas las mujeres con capacidad reproductiva; según prescrito por el médico. Para estos medicamentos se aplicará cero (\$0) dólares de copago o cero (0%) por ciento de coaseguro. Los métodos anticonceptivos no pueden proveerse bajo reembolso. Incluye además Espermaticida (Spermicide Alone) y Ulipistal Acetate (Conocido como Ella Tableta Oral 30MG). Los métodos anticonceptivos cubiertos se encuentran en el Formulario de Medicamentos.	Visita subsiguiente: 99394- 99396 58301 A4261 A4264 A4266 A4268 A4269 J7300 J7296 J7298 J7304 J7306 J7307 S4981 S4989 S4993 11980 J7294 11980 11981 11982 11983 57170 58300 58301 58565 58600 58605 58611 58615 58661 58670 58671 58720	Z30.02, Z30.09, Z30.2, Z30.40, Z30.41, Z30.42, Z30.430, Z30.431, Z30.432 Z30.433, Z30.49, Z30.8 Z30.432	
Suplementos de ácido fólico	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda que todas las mujeres que estén planificando o que esten hábiles para quedar embarazadas tomen un suplemento diario que contenga de 0.4 a 0.8 mg (400 a 800 pg)	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99384-99386 Visita subsiguiente: 99394- 99396	Z41.8	
Pruebas de Cernimiento de diabetes gestacional	Cernimiento de diabetes mellitus gestacional en mujeres embarazadas asintomáticas después de (24-28) semanas de gestación y en la primera visita prenatal para mujeres embarazadas identificadas como alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus.	Código(s) Procedimiento(s): 82947, 82951, 83037	Z13.1, Z86.32, Z34.00-Z34.93, O09.00-O09.03, O09.10-O09.13, O09.291, O09.40- O09.43, O09.211- O09.219, O09.10- O09.13, O09.291- O09.299, O09.30- O09.33, O09.511- O09.519, O09.521- O09.529, O09.611- O09-.619, O09.621- O09.629, O09.811-O09.819, O09.821-O09.829, O36.80X0-36.80X9, O09.70-O09.73, O09.891-O09.899, O09.90-O09.93	82947, 82951, 83037
Virus de la Hepatitis B	Cernimiento para la infección del virus de la Hepatitis B para mujeres embarazadas en su primera visita prenatal.	Código(s) Procedimiento(s): 80055, 87350, 87340 ó 80081	Z34.00-Z34.93, O09.00-O09.03, O09.10-O09.13, O09.291, O09.40- O09.43, O09.211- O09.219, O09.10-	80055, 87350, 87340 ó 80081

			009.13, 009.291-009.299, 009.30-009.33, 009.511-009.519, 009.521-009.529, 009.611-009.619, 009.621-009.629, 009.811-009.819, 009.821-009.829, 036.80X0 036.80X9, 009.70-009.73, 009.891-009.899, 009.90-009.93	
Consejería y cernimiento de detección para la infección del Virus de Inmuno Deficiencia (VIH)	Los clínicos deberán realizar cernimiento a todas las mujeres embarazadas, el cernimiento de VIH incluyendo aquellas que estén en trabajo de parto que no han sido objeto de prueba y las cuales su estatus de VIH es desconocido. Con relación a las mujeres embarazadas todas las Organizaciones de Servicios de Salud están obligadas a cubrir y no imponer requisitos de copagos respecto con las siguientes pruebas incluidas en las recomendaciones más recientes del US Preventive Services Task Force (USPSTF). Una primera prueba de VIH durante el primer trimestre del embarazo en la primera visita prenatal, y 2. Una segunda prueba durante el tercer trimestre del embarazo (entre las 28 y 34 semanas de gestación). Además, deberán realizar la consejería y cernimiento anualmente para todas las mujeres sexualmente activas.	Código(s) Procedimiento(s): 86689, 86701, 86702, 86703, 87390, 87534, 87535, 87536, G0433, G0432 ó G0435 ó G0475, G0445	Z21, Z11.4, Z11.59, Z34.00-Z34.93, Z71.7, 009.00-009.03, 009.10-009.13, 009.291-009.299, 009.30-009.33, 009.511-009.519, 009.521-009.529, 009.611-009.619, 009.621-009.629, 009.811-009.819, 009.821-009.829, 036.80X0-036.80X9, 009.70-009.73, 009.891-009.899, 009.90-009.93	86689, 86701, 86702, 86703, 87390, 87534, 87535, 87536, G0433, G0432, G0435, G0475, G0445
Prueba de alto riesgo del Virus del Papiloma Humano (Human Papiloma) (Prueba de DNA)	Aplica a mujeres con resultados normales de citología. Esta prueba de cernimiento debe realizarse a partir de los 30 años, y una frecuencia de cada tres años.	Código(s) Procedimiento(s): 87623, 87624, 87625 ó G0476	Z11.51	
Violencia de pareja íntima, abuso de ancianos y abuso de adultos vulnerables: detección: mujeres en edad reproductiva	La USPSTF recomienda que los médicos realicen pruebas de detección de violencia de pareja íntima (VPI) en mujeres en edad reproductiva y proporcionen o remitan a las mujeres con pruebas positivas a servicios de apoyo continuos.	Consejería: 99401-99404	Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419	
Aspirina para la prevención de preclamsia en mujeres embarazadas	El USPSTF recomienda el uso de aspirina en dosis bajas (81 mg / d) como medicamento preventivo después de (12) semanas de gestación en mujeres con alto riesgo de preeclampsia.	Código(s) Procedimiento(s): Visita inicial: 99384-99387 Visita subsiguiente: 99394-99397 Consulta: 99401-99404	Normal Pregnancy : Z34.00-Z34.03 Z34.80-Z34.83 Z34.90-Z34.93 Supervision of High Risk Pregnancy: 009.00-009.03 009.10-009.13 009.291-009.299 009.40-009.43 009.211-009.219 009.30-009.33 009.511-009.519 009.521-009.529 009.611-009.619 009.621-009.629 009.811-009.819 009.821-009.829 Maternal Care for Other Fetal	

			Problems: O36.80X0-O36.80X9 O09.70-O09.73 O09.891-O09.899	
Osteoporosis	Cernimiento, prueba de densitometría ósea para mujeres de 65 años o más de edad, en estado post menopáusico y en mujeres menores de 65 años cuyo factor de riesgo de fractura es igual o mayor al de una mujer de 65 años que no tiene riesgos adicionales. La USPSTF recomienda cernimiento para osteoporosis con densitometría para prevenir fracturas en mujeres de 65 años en adelante.	Código(s) Procedimiento(s): 77078, 77080, 77081, 76977, 78350-78351, 77086	Z13.820, M81.0, Z00.0, Z78.0	77078, 77080- 76977, 78350- 78351, 77086
Cernimiento de Preclamsia	La USPSTF recomienda cernimiento de preclamsia en mujeres embarazadas con alta presión durante el embarazo.	Código(s) Procedimiento(s): 85025, 81025, 82570, 84156	Z01.31, Z32.0, R03.0, O12, O26	85025, 81025, 82570, 84156
Clasificación de Grupo Sanguíneo - Factor Rh(D)	La USPSTF altamente recomienda la prueba de tipo de sangre Rh (D) y pruebas de anticuerpos para todas las mujeres embarazadas durante su primera visita de cuidado prenatal. Además el US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda la repetición de las pruebas anticuerpos Rh(D) para todas mujeres Rh(D) negativo no sensibilizadas en las 24 a 28 semanas de gestación a menos que se conozca que el padre biológico es RH(D) negativo.	Código(s) Procedimiento(s): 86901, 90384-90386, 96372, 96374, 96366, 96365, 80055 ó 80081	Z34.00-Z34.93, Z39.1, O09.00- O09.03, O09.10- O09.13, O09.291, O09.40- O09.43, O09.211-O09.219, O09.10-O09.13, O09.291-O09.299, O09.30- O09.33, O09.511-O09.519, O09.521-O09.529, O09.611- O09-.619, O09.621- O09.629, O09.811-O09.819, O09.821-O09.829, O36.80X0 O36.80X9, O09.70-O09.73, O09.891-O09.899, O09.90-O09.93	86901, 90384- 90386,96366, 96365, 80055 ó 80081
Sífilis	La USPSTF recomienda que los clínicos realicen cernimiento de infección de sífilis a todas las mujeres embarazadas.	Código(s) Procedimiento(s): 86592, 86593, 87166, 87164, 87285, 80055, 86780 or 80081	Z34.00, Z34.01, Z34.02,Z34.03, Z34.80, Z34.81, Z34.82, Z34.83, Z34.90,Z34.91, Z34.92, Z34.93, Z33.1, O09.00- O09.03,O09.10- O09.13, O09.291, O09.40-O09.43, O09.211-O09.219, O09.10-O09.13, O09.291-O09.299, O09.30-O09.33, O09.511-O09.519, O09.521-O09.529, O09.611-O09-.619, O09.621-O09.629, O09.811-O09.819, O09.821-O09.829, O36.80X0- O36.80X9, O09.70-O09.73, O09.891-O09.899, O09.90-O09.93	86592, 86593, 87166, 87164, 87285, 80055, 86780 ó 80081
Uso de Tabaco	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda que los clínicos pregunten a todas las mujeres embarazadas sobre el uso de Tabaco, le aconsejen detener el uso del Tabaco	Consejería: 99406 - 99407 Visita inicial: 99384- 99386	Z87.891, Z72.0, Z71.6, Z34.00, Z34.01, Z34.02, Z34.03, Z34.80,	

	y provean intervenciones conductuales para el cese en mujer embarazadas.	Visita subsiguiente: 99394- 99396	Z34.81, Z34.82, Z34.83, Z34.90, Z34.91, Z34.92, Z34.93, Z33.1	
Visitas Preventivas de Mujeres	Visitas preventivas de mujeres anualmente (dependiendo de la salud de la mujer, sus necesidades de salud y otros factores de riesgo) o para que las mujeres adultas obtengan servicios preventivos recomendados que sean apropiadamente desarrollados para su edad, incluyendo cuidado de preconcepción y otros servicios necesarios para el cuidado prenatal. Estas visitas deben, cuando sea apropiado, incluir otros servicios preventivos enumerados. Si el Clínico determina que un paciente requiere visitas adicionales, las mismas deben ser provistas sin copagos.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99384-99387 Visita subsiguiente: 99394-99397	Z34.00-Z34.93, O09.00-O09.03, O09.10-O09.13, O09.291, O09.40-O09.43, O09.211-O09.219, O09.10-O09.13, O09.291-O09.299, O09.30-O09.33, O09.511-O09.519, O09.521-O09.529, O09.611-O09.619, O09.621-O09.629, O09.811-O09.819, O09.821-O09.829, O36.80X0-O36.80X9, O09.70-O09.73, O09.891-O09.899, O09.90-O09.93	
Depresión Perinatal (Consejería e Intervención)	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda que lo clínicos provean o refieran a mujeres embarazadas y mujeres post-parto quienes están en alto riesgo de depresión perinatal a intervenciones de consejería.	Medicina Preventiva Individual Consejería: 99401, 99402, 99403, 99404 Medicina Preventiva Grupal Consejería: 99411, 99412 Prenatal Visits: 59425, 59426 Medicina Preventiva (Evaluation and Management): 99381, 99382, 99383, 99384, 99385, 99386, 99387, 99391, 99392, 99393, 99394, 99395, 99396, 99397	Z39.2, Z13.32	
Cernimiento de incontinencia urinaria en mujeres	Los Servicios Preventivos para Mujeres recomienda la detección de mujeres para la incontinencia urinaria como un servicio preventivo. Los factores asociados con un mayor riesgo de incontinencia urinaria incluyen aumento de la paridad, edad avanzada y obesidad; sin embargo, estos factores no deben usarse para limitar la detección. Varias herramientas de cribado demuestran una precisión justa a alta en la identificación de la incontinencia urinaria en mujeres. Aunque se desconocen los intervalos mínimos de cribado, dada la prevalencia de la incontinencia urinaria, el hecho de que muchas mujeres no presenten síntomas voluntariamente y los factores de riesgo múltiples y que cambian con frecuencia asociados con la incontinencia, es una conducta anual	Consulta: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99387 Visita subsiguiente 99391- 99397 Código(s) Procedimiento(s): 87081, 87084, 87086 or 87088	N32.0 - N32.9, N39.3 - N39.9, R32, R39.81 - R39.89	87081, 87084, 87086, 87088
Cernimiento para diabetes Mellitus II	Detección de diabetes mellitus en mujeres con antecedentes de diabetes mellitus	Código(s) Procedimiento(s):	Z86.32	

después del embarazo	gestacional (DMG) que actualmente no están embarazadas y que no han sido diagnosticadas previamente con diabetes mellitus tipo II. Las pruebas iniciales deberían realizarse idealmente durante el primer año posparto y realizarse tan pronto como a las 4-6 semanas posparto.	82947, 83036, 82950		
Cernimiento para la detección de ansiedad	Los Servicios Preventivos para Mujeres recomienda la detección de ansiedad en mujeres adolescentes y adultas, incluidas aquellas que están embarazadas o en el posparto. Se desconocen los intervalos óptimos de detección y se debe usar el juicio clínico para determinar la frecuencia de detección. Dada la alta prevalencia del trastorno de ansiedad, la falta de reconocimiento en la práctica clínica y los múltiples problemas asociados con la ansiedad no tratada, los médicos deberían considerar evaluar a las mujeres que no han sido examinadas recientemente.	Código(s) Procedimiento(s): 99381- 99387, 99391-99397, 99401- 99404, 99411, 99412	Z39.2, Z13.32	
Servicio Preventivo Niños	Indicación	CPT or HCPCS Code(s)	ICD-10 Diagnóstico	Modificador 33
Anemia / Suplementos de Hierro	Para niños en edades de 4 meses hasta los 21 años a riesgo de anemia.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381, 99382 Visita subsiguiente: 99391, 99392	Z13.0	
Autismo	Cernimiento para niños entre 18 y 24 meses; conforme a la Ley 220 del 4 de septiembre de 2012. Esto incluirá, pero no se limitará a, genética, neurología, inmunología, gastroenterología y nutrición; terapia del habla y lenguaje y terapias psicológicas, ocupacional y física e incluirá las visitas médicas y las pruebas referidas medicamente.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99382 Visita subsiguiente: 99392	Z00.121, Z00.129, Z13.42	
Concentración de Bilirrubina	Cernimiento para recién nacidos.	Código(s) Procedimiento(s): 82247, 88720	Z00.110	
Evaluación de Salud Conductual	Niños de todas las edades, 0-11 meses, 1-4 años, 5-10 años, 11-14 años 15 a 17 años.	Consejería 99401-99404 Visita inicial: 99381-99384 Visita subsiguiente: 99391-99394	Z00.121, Z00.129, Z00.110, Z00.111, Z13.89	
Displasia Cervical	Cernimiento para niñas sexualmente activas	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99384 Visita subsiguiente: 99391-99394	Z72.51, Z72.52, Z72.53	
Prevención de caries dental: infantes y niños hasta la edad de 5 años	La USPSTF recomienda que los clínicos de cuidado primario ordenen suplementos de fluoruro oral comenzando a la edad de 6 meses para aquellos niños en los cuales el suministro de agua tiene deficiencia en fluoruro. La USPSTF recomienda que los clínicos de cuidado primario apliquen fluoruro a los dientes primarios de todos los bebés y niños comenzando en la edad donde comienzan a nacer los dientes.	D1208	Z01.20, Z01.21	
Cernimiento para la	El US Preventive Services Task Force (USPSTF)	Consejería: 99401-	Z13.89	

Depresión	recomienda un cernimiento a adolescentes de las edades de 12 a 18 años, para desorden depresivo mayor cuando existe una estructura que ayude a establecer un diagnóstico preciso, un tratamiento efectivo y un seguimiento apropiado.	99404 Visita inicial: 99384, 99385 Visita subsiguiente: 99394, 99395		
Cernimiento de desarrollo	Cernimiento para niños menores de 3 años y vigilancia durante toda la niñez.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99382 Visita subsiguiente: 99391-99392	Z00.121, Z00.129	
Dislipidemia	Cernimiento para todos los niños entre 9-11 años y 17-21 años. Cernimiento para niños a riesgo de desórdenes de lípidos Edades: 1-4 años, 5 -10 años, 11-14 años, 15 - 16 años	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99384 Visita subsiguiente: 99391-99394 Códigos de procedimientos: 80061, 82465, 83718, 84478	Z13.220	80061, 82465, 83718, 84478
Cernimiento Auditivo	Evaluación para pérdida de audición de todos los infantes recién nacidos y niños entre 11-14 años, 15-17 años y 18-21 años.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99384 Visita subsiguiente: 99391-99394 Códigos de procedimientos: 92587, 92588, 92551, 92552, 92567, 92650, 92651, 92652, 92653	Z01.110, Z01.10, Z01.12, Z01.118, Z00.2, Z00.3, Z00.121, Z00.129	92587, 92588, 92551, 92552, 92567, 92650, 92651, 92652, 92653
Cernimiento de crecimiento de estatura, peso y masa de índice corporal (BMI)	Cernimiento para los niños. Edades: 0-11 meses, 1-4 años, 5 – 10 años, 11-14 años y de 15 - 17 años	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99384 Visita subsiguiente: 99391-99394	Z00.121, Z00.129	
Cernimiento de Presión Sanguínea	Evaluación para niños Edades: (0) a (11) meses, (1) a (4) años, (5) a (10) años, (11) a (14) años, (15) a (17) años.			
Cernimiento de Sangre	Cernimiento para recién nacidos.			
HIV	Cernimiento clínico para infección de HIV en adolescentes y adultos entre las edades de 15 a 65 años. Jóvenes y adultos mayores quienes están en alto riesgo se les debe de realizar también el cernimiento. Según requerido Ley 45 de 2016 una prueba de HIV al año debe ser incluida como partes de las pruebas rutinarias de cualquier evaluación médica, excepto para las mujeres embarazadas a las cuales les aplica los requerimientos del USPSTF: Una primera prueba de HIV durante el primer trimestre del embarazo en su primera visita prenatal y una segunda prueba durante el tercer trimestre del embarazo entre la semana 24 y 28 de gestación.	Códigos de Procedimientos: 86689, 86701, 86702, 86703, 87390, 87534, 87535, 87536, 87389, 87391, 87537, 87538, 87539, 87901, 87903, 87904, 87906, G0432, G0433, G0435, S3645	Z21, Z11.4, Z11.59 Z20.2, Z11.3, Z20.6	86689, 86701, 86702, 86703, 87390, 87534, 87535, 87536, 87389, 87391, 87537, 87538, 87539, 87901, 87903, 87904, 87906, G0432, G0433, G0435
Hipotiroidismo Congénito	Cernimiento para recién nacidos	Códigos de Labs: 80418, 80438, 80439, 84443, 84146	Z13.29	80418, 80438, 80439, 84443, 84146

Cernimiento hemoglobinopatías: recién nacidos	Detección de anemia de células falciformes en recién nacidos.	Código(s) de Procedimiento(s): 85013, 85014, 85018, 85025, 85027, 85041, G0306, G0307	Z00.129	
Cernimiento de Plomo	Cernimiento para niños con alto riesgo a la exposición de plomo.	Código(s) de Procedimiento(s): 83655	Z13.88	
Depresión maternal	Pruebas de detección para madres de infantes en las visitas de 1, 2, 4 y 6 meses.	Consejería: 96161	Z00.110, Z00.111, Z00.121, Z00.129	
Historial Médico	Para todos niño durante el desarrollo; edades 0 a 21 años.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99384 Visita subsiguiente: 99391-99394	Z00.121, Z00.129	
Obesidad	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda que los clínicos evalúen los niños de 6 años o más por obesidad y le ofrezcan o refieran para una intervención intensiva comprensiva conductual para promover el mejoramiento del estatus de peso.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99383-99385 Visita subsiguiente: 99393-99395	Z71.2, Z76.89, Z13.89	
Ocular Prophylaxis for Gonococcal Ophthalmia Neonatorum: Preventive Medication	La USPSTF recomienda como prevención la medicación de Profilactic Ocular Topical para todos los recién nacidos para la prevención de Gonococcal Ophthalmia Neonatorum (gonorrea).	Código(s) de Procedimiento(s): 99381	Z00.121, Z00.129	
Suplementos Orales de Fluoruro	Suplementos Orales de Fluoruro para Niños comenzando los seis (6) meses cuyo recurso de agua potable no tenga fluoruro.	Código(s) de Procedimiento(s): 99188		
Salud Oral: Barniz de Floruro	La USPSTF recomienda la aplicación de barniz de fluoruro a los dientes de leche de todos los bebés y niños a partir de la edad de la erupción de los dientes de leche.			
Phenylketonuria (PKU)	Cernimiento en recién nacidos para desordenes genéticos "Phenylalanine Free Amino Acids Preparation" para pacientes diagnosticados con el trastorno genético denominado como fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés), independientemente de la edad del paciente, de acuerdo a la Ley 139 del 8 de agosto de 2016	Códigos de Procedimientos: 84030, S3620	Z13.228	84030, S3620
Hematocritos o Hemoglobina	Cernimiento para los niños.	Códigos de Procedimientos: 85013, 85014, 85018, 85025, 85027	Z00.121, Z00.129, Z00.110, Z00.111, Z13.0	85013, 85014, 85018, 85025, 85027
Consejería conductual para Cáncer de Piel	Consejería a jóvenes adultos entre 6 meses a 24 años para minimizar la exposición a radiación ultravioleta para reducir los riesgos de cáncer en piel	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99385 Visita subsiguiente: 99391-99395	Z11.3, Z12.83	
Uso de Tabaco	La USPSTF recomienda que los médicos brinden intervenciones, incluida educación o asesoramiento breve, para evitar el inicio del consumo de tabaco en niños y adolescentes en edad escolar.	Consejería: 99406, 99407 Visita inicial: 99381-99385 Visita subsiguiente: 99391-99395	Z87.891, Z72.0, Z71.6, F17.200, F17.201	
Salud Oral	Evaluación de riesgos para niños pequeños de edades: 0-11 meses, 1-4 años, 5-10 años.	Procedimiento(s) Dentales: D0120, D0140, D0150, D0160, D0180		

Tabaco, Alcohol o Uso de Sustancias Controladas	Cerminiento para niños entre las edades de 11 a 21 años.	Consejería: 99401-99404, 99406-99409 Visita inicial: 99383-99385 Visita subsiguiente: 99393-99395	Z13.89, Z72.0 Z02.83, Z71.41 Z71.51, Z71.6	
Tuberculina	Prueba de tuberculina para niños a riesgos de tuberculosis. Edades: 0-11 meses, 1-4 años, 5 – 10 años, 11-14 años 15 – 21 años.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99381-99385 Visita subsiguiente: 99391-99395 Código(s) de Procedimiento(s): 99211-99215, 86580	Z11.1, Z00.121, Z00.129	86580
Servicios de visión cubiertos para menores de 21 años.	El US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda al menos una (1) evaluación de visión para todos los niños entre las edades de 3 a 5 años, para detectar la presencia de ambliopía o sus factores de riesgo.	Consejería: 99401-99404 Visita inicial: 99382-99383 Visita subsiguiente: 99392-99393 Código(s) de procedimiento(s): 92081-92083, 99172-99174, 92002, 92004, 92012, 92014	Z01.00, Z01.01	92081 - 92083, 99172-99174, 92002, 92004, 92012, 92014
Immunization - Hepatitis B (Hep B)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) de Procedimiento(s): 90740, 90743, 90744, 90747, 90748, S3645	Z23	
Immunization - Difteria, Tétano y Pertusis (Tos Ferina) (DTaP)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) de Procedimiento(s): 90700 Combinación de Vacunas: 90698, 90723	Z23	
Immunization - Tetanus, Diphtheria and acellular Pertussis (Tdap)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) de Procedimiento(s): 90715	Z23	
Immunization - Rotavirus	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del	Código(s) de Procedimiento(s): 90680, 90681	Z23	

	Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).		
Immunization - Inactivated Polio Virus (IPV)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Código(s) de Procedimiento(s) 90713 Combinación de Vacunas: 90696, 90698	Z23
Immunization - Haemophilus Influenzae, Type B (Hib)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Códigos de Procedimiento(s): 90646, 90647, 90648 Combinación de Vacinas: 90698, 90721, 90644	Z23
Immunization - Pneumococcal (PCV) and (PPV)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Códigos de Procedimiento(s): 90670, 90732	Z23
Immunization - Measles, Mumps and Rubella (MMR)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Códigos de Procedimiento(s): 90707, 90710	Z23
Immunization - Varicella (Var)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Códigos de Procedimiento(s): 90710, 90716	Z23
Immunization - Hepatitis A (Hep A)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Códigos de Procedimiento(s): 90633, 90634, 90636	Z23
Immunization -	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas	Códigos de	Z20.811, Z23

Meningococcal (MCV)	por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Procedimiento(s): 90733, 90734, 90644, 90620, 90621
Immunization – Influenza (Flu Shot)	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC).	Códigos de Z23 Procedimiento(s): 90654-90658, 90660- 90662, 90672, 90673, 90674, 90685-90688
Immunization - Human Papillomavirus (HPV) - vaccine to prevent cervical cancer	Vacunas, consejería y vacunas recomendadas por el Departamento de Prevención de EE. UU. y el <i>Preventive Service Task Force</i> y por el Calendario de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico están cubiertos para niños, adolescentes menores de 21 años y adultos según las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC). La vacunación HPB comienza a la edad de los 9 años para los niños y jóvenes con historial de abuso sexual o violación quienes no han comenzado o completado la serie de 3 dosis. (Recomendación de ACIP)	Códigos de Z11.51, Z23 Procedimiento(s): 90649, 90650, 90651
Immunization – COVID-19	Vacuna COVID-19 como parte de las inmunizaciones preventivas para niños de cinco (5) años y adultos, de acuerdo con el orden establecido por el Departamento de Salud de Puerto Rico y las recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), de los Centros de Enfermedades Control y Prevención (CDC), de conformidad con el Artículo 2.050 (C) del Código de Seguros de Salud de Puerto Rico.	Código(s) Procedimiento(s): 91300*, 0001A, 0002A, 0003A, 0004A, 91301*, 0011A, 0012A, 0013A, 91303*, 0031A, 0034A *Los proveedores no deben facturar el producto si lo recibieron de forma gratuita.